

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára

Arnikamed Dolo gél árnika tinktúra

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3-4 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Arnikamed Dolo gél és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Arnikamed Dolo gél alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Arnikamed Dolo gélt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Arnikamed Dolo gélt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Arnikamed Dolo gél és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Arnikamed Dolo gél hagyományos növényi gyógyszer, mely a véraláfutások, rándulások és helyi izomfájdalom enyhítésére alkalmazható.

Az Arnikamed Dolo gél hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazandó.

Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 3-4 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

2. Tudnivalók az Arnikamed Dolo gél alkalmazása előtt

Ne alkalmazza az Arnikamed Dolo gélt

- ha allergiás az árnikára, ill. az árnika családjába Asteraceae (Compositae) tartozó más növényekre vagy a gyógyszer egyéb összetevőjére (6. pontban felsorolt).

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Arnikamed Dolo gél alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Kerülni kell a sérült bőrfelülettel történő érintkezést.

Ha a tünetek a gyógyszer alkalmazása közben rosszabbodnak, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Gyermekek és serdülők

12 év alatti gyermekek számára az alkalmazása a megfelelő adatok hiánya miatt nem javasolt.

Egyéb gyógyszerek és az Arnikamed Dolo gél

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint az alkalmazni kívánt egyéb gyógyszereiről. Gyógyszerköölcsönhatásokról eddig nem számoltak be.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Adatok hiánya miatt a gyógyszer alkalmazása a terhesség és a szoptatás időszakában elővigyázatosságból nem ajánlott.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nincs szükség különleges óvintézkedésre.

Az Arnikamed Dolo gél makrogol-glicerín-hidroxisztearátot tartalmaz.

100 g Arnikamed Dolo gél 3 g makrogol-glicerín-hidroxisztearátot tartalmaz, amely bőrreakciókat okozhat.

3. Hogyan kell alkalmazni az Arnikamed Dolo gél?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Ha az orvos másként nem rendeli, naponta kétszer-háromszor vékony rétegben kenje be az érintett területet az Arnikamed Dolo géllel.

Az alkalmazás időtartama legfeljebb 2 hét lehet.

Ha a készítmény alkalmazása mellett a tünetek 3-4 napnál hosszabb ideig fennállnak, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Alkalmazás gyermekeknél és serdülőknél:

12 év alatti gyermekek számára az alkalmazása nem javasolt.

Az alkalmazás módja:

Külsőleg alkalmazásra.

Ha az előírtnál több Arnikamed Dolo gél alkalmazott

Túladagolást nem jelentettek.

Ha elfelejtette alkalmazni az Arnikamed Dolo gél

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Allergiás reakciók, például viszketés, bőrvörösödés és ekcéma alakulhatnak ki. A tünetek előfordulási gyakorisága nem ismert (a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg).

Mellékhatások bejelentése

Ha Önénél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Arnikamed Dolo gél-t tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert.

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felbontás után 6 hónapig használható.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Arnikamed Dolo gél?

- A készítmény hatóanyaga az árnika tinktúra. 100 g gél 24 g árnikavirág tinktúrát (*Arnica montana* L., flos) tartalmaz (1:10).
Kivonószer: etanol 70% (V/V).
- Egyéb összetevők:
Etanol 96% (V/V), makrogol-glicerín-hidroxisztearát (40), karbomer, 10%-os ammónia oldat, közepes szénláncú trigliceridek, tisztított víz.

Milyen az Arnikamed Dolo gél külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Sárgás-barnás színű, opálos gél.

50 g, vagy 100 g Arnikamed Dolo gél fehér PP csavaros kupakkal záródó alumínium tubusba töltve, dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10

66424 Homburg

Németország

OGYI-TN-62/01 1x50 g

OGYI-TN-62/02 1x100 g

Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neveken engedélyezték:

tagállam megnevezése	gyógyszer neve
Ausztria	Arnikamed Dolo Gel
Bulgária	Арникамед Долор гел
Csehország	Arnimed Gel
Horvátország	Arnikamed Dolo gel
Magyarország	Arnikamed Dolo gél
Olaszország	Arnimed
Románia	Arnimed Gel
Szlovákia	Arnikamed gél

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2016. szeptember