



ajakherpesz gél

Orvostechnikai eszköz

tisztán ásványi szilíciumgéllel

KEDVES FELHASZNÁLÓ!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót, mivel fontos tájékoztatást nyújt a termék alkalmazásával kapcsolatban. Amennyiben kérdései lennének, forduljon szakemberhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Mikor használhatja a Hübner Original silicea ajakherpesz gélét?
Az ajakherpesz gél külsőleg alkalmazandó.

- Az ajakherpesz (Herpes labialis) kialakulásakor jelentkező égető és viszkető érzés csillapítására.
- Kiszáradt herpeszhólyagocskákat.

ADAGOLÁSI JAVASLAT

A HASZNÁLAT MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA:

Mikor, milyen gyakran és meddig használja a Hübner Original silicea ajakherpesz gélét?

12 éves kor feletti gyermekek és felnőttek számára egyaránt alkalmazható. Egyéni szükséglet szerint, a herpesz első jeleinek észlelésekor, naponta legfeljebb ötször vigye fel az ajakherpesz gélét az érintett bőrfelületre mindaddig, míg a hólyagocskák teljesen el nem múlnak. Hogyan alkalmazza a Hübner Original silicea ajakherpesz gélét? Az ajakherpesz gélét legfeljebb naponta ötször a kereskedelemben kapható vattapálccával, vagy tiszta ujjbeggyel vigye fel az érintett bőrfelületre.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: ⚠

Eredménytelen kezelés esetén, legkésőbb 10 nap után forduljon orvoshoz. 12 év alatti gyermekek esetében az alkalmazás orvossal történő egyeztetés alapján történhet meg. Ennek az orvostechnikai eszköznek sokévi használata során káros hatást nem figyeltek meg. Terhesség és szoptatás esetén azonban mindig csak az orvossal történő megbeszélést követően szabad használni. Kérjük, hogy jelezzen a gyártónak és az ország illetékes hatóságának minden olyan felmerülő, súlyos eseményt, mely a készítménnyel összefügg. Az ajakherpesz gél gyermekek elől elzárva tartandó.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: ⓘ

Higiéniai okokból és a fertőzés elterjedésének elkerülése érdekében a gél felvitele előtt és után alaposan mosson kezet! A fertőzés másik emberre történő átvitelének elkerülése érdekében egy tubust csak egy személy használjon. Használat után ajánlatos letörölni a tubus száját. Alkalmazás után zárja le a tubust. A gél megszárítása után fehér felület képződhet. Ez a herpeszhólyagocskák kiszáradásának a jele.

MELLÉKHATÁSOK:

Ez az orvostechnikai eszköz kálium-szorbátot tartalmaz. A kálium-szorbát helyi bőrirritációt okozhat (pl.: kontakt dermatitisz). További mellékhatás nem ismeretes.

KÖLCSÖNHATÁS MÁS SZEREKKEL:

Nem ismeretes.

ELLENJAVALLATOK: ⚠

Mikor nem szabad használni a Hübner Original silicea ajakherpesz gélét?

Ellenjavallatok nem ismeretesek, azonban ha a termék bármely összetevőjével szembeni túlérzékenységről van tudomása, ne alkalmazza a készítményt.

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ ELTARTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁS ÉS ADATOK: ⌚

A készítményt csak a tubuson és dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. Felnyitás után legfeljebb 6 hónapig használható fel.

Ne tárolja a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten.

KISZERELÉS ÉS TARTALOM:

A tubus 2 g gél tartalmaz, külsőleges alkalmazásra.

ÖSSZETÉTEL:

Mit tartalmaz a Hübner Original silicea ajakherpesz gél?

Hatékony összetevő: 2 g gél 1,9 g kovasavgél (szilíciumgél) tartalmaz. Egyéb összetevők: pentilén-glikol, karragén, alfa-bizabolol, kálium-szorbát, citromsav oldat.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK DÁTUMA:

2020. március



ANTON HÜBNER GmbH & Co.

KG D-79236 Ehrenkirchen, Németország



www.huebner-vital.de

CE 0297

FORGALMAZZA:

Naturprodukt Kft., 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8

FONTOS TUDNIVALÓK AZ AJAKHERPESZRŐL:

A herpesz-vírusfertőzés az egyik leggyakoribb vírusos megbetegedés az emberek körében, a lakosság mintegy 90%-a vírushordozó.

A fertőzöttek kb. 20%-ánál az ajakherpesz meg is jelenik. Különböző kiváltó okok, pl. láz, erős UV-sugárzás, vagy stressz miatt a herpesz kialakulását előidéző tényezők újra és újra aktivizálódnak. A herpeszt az emberek egymás között is terjeszthetik. Bizsergés, égető érzés és viszketés az első ajakherpeszre utaló jel, mielőtt a herpeszhólyagocskák megjelennének. Ezek a nedvező hólyagocskák rendkívül fertőzőek. A kezelés során fontos a hólyagocskák célzott kiszáritása és ezáltal a fertőző váladék terjedésének megakadályozása.

HÜBNER ORIGINAL SILICEA AJAKHERPESZ GÉL:

A szilíciumgél elősegíti a hólyagocskák célzott kiszáritását. A tiszta ásványi szilíciumgél rendkívüli váladékmegkötő képessége révén a már kialakult hólyagocskákat gyorsan kiszáritja és elősegíti a gyógyulást.



A Hübner Original silicea ajakherpesz gél használatát már az első bizsergető érzés jelentkezésekor el kell kezdeni!

A Hübner Original silicea ajakherpesz gél aktív alkotóeleme a szilíciumgél (kovasavgél), a szilícium ásványi anyag oxigénnel és vízzel alkotott vegyülete. A szilíciumgél különlegessége abban rejlik, hogy az égető érzés és viszketés enyhítése mellett rendkívül jól megkötí a sebváladékot. Ezáltal természetes módon csökkenti a herpeszhólyagocskák fertőző sebváladékát - a hólyagocskákat célzottan kiszáritja.

Ezáltal gátolja a vírusterjedését és felgyorsítja a gyógyulást.

TANÁCSOK A MEGELŐZÉSRE ÉS VÉDELME:

- Az egészséges életvitel, változatos étrend, sport és elegendő alvás megerősíti a szervezet védekező rendszerét.
- Erős napsütésben magas fényvédő faktorú napvédő használata ajánlott.
- Az ajakherpesz átvihető más testrészekre, sőt más személyekre is. Ezért:
 - > Ne kaparja el a hólyagocskákat!
 - > Az ajkával érintkező tárgyakat (pl. csésze, törölköző, stb.) ne adjon át másoknak!
 - > Ne csókolózzon, kisgyermeket ne puszi/gasson!



✓ Enyhíti az ajakherpesz megjelenésekor fellépő égető és viszkető érzést.

✓ Kiszáritja a herpeszhólyagocskákat.



*Zichocki, L., et al. (2007), silica gel is as effective as acyclovir cream in patients with recurrent herpes labialis: results of a randomized, open-label trial." J Dermatolog Treat 19(3): 176-181.