

Betegtájékoztató

Mielőtt elkezdene a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múlt panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírászerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Dr. Theiss Echinacea csepp

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását tudományos eredmények igazolják.

Mi a készítmény hatóanyaga?

100 g készítmény 33 g keskenylevelű kasvirág őstinktúrát tartalmaz.

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagként 50 tf% alkoholt tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

Fertőzések megbetegedések megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésére, a szervezet ellenállóképességének fokozására.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmaznia?

Ha Ön a kasvirágra [vagy más fészkesvirágzatú növényre (pl. kamillára, őszi margitvirágra stb.)] allergiás, a készítményt nem használhatja. Nem alkalmazható a készítmény előrehaladott szisztémás megbetegedések – tuberkulózis, fehérvérűség, kötőszöveti elváltozások, szklerózis multiplex, AIDS-megbetegedés, HIV-fertőzés és egyéb autoimmun megbetegedés – esetén.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?

A készítmény 50 tf% alkoholt tartalmaz, melynek 10 cseppje 0,208 g alkoholnak felel meg. A készítmény nem adható gyermekeknek, terheseknek epilepsziásoknak, agysérülés és más központi idegrendszeri betegség esetén.

Szedhetik-e a készítményt gyermekek is?

Alkoholtartalma miatt 14 éven aluli gyermekek nem szedhetik!

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?

Módosíthatja vagy növelheti más gyógyszerek hatását.

Alkoholfogyasztás tilalmát előíró, vagy immunszuppresszív (immunválaszt elnyomó) gyógyszer-készítmények mellett nem alkalmazható.

Kérje orvosa véleményét, ha egyidejűleg más, a szervezet ellenállóképességét fokozó készítményt is szed.

Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt?

Várandósok és szoptató anyák nem alkalmazhatják a készítményt.

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?

Az alkoholos oldat a száj nyálkahártyájáról gyorsan felszívódik, ezért előnyös, ha lenyelés előtt rövid ideig a szájban tartjuk.

Használat előtt felrázandó!

Mi az ajánlott adag?

Megelőzésre 3 x 20 cseppet, akut fertőzés esetén az első napon először 50 csepp, majd 2 napig óránként 10-20 cseppet adagoljunk.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Nagyon ritkán túlérzékenység előfordulhat; kiütés, viszketés, duzzadás az arcon, nehézlégzés, szédülés, alacsony vérnyomás.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Az esetleges üledékkiválás a készítmény minőségét nem befolyásolja. A közlekedésben történő részvétel vagy gépekkel végzendő munka során a reakcióidő lelassulhat, ezért gépjárművezetők és veszélyes helyen dolgozók a készítményt csak közvetlenül alvás előtt alkalmazzák!

Ha panasza 4–5 nap alkalmazás után sem enyhülnek, feltétlenül forduljon orvoshoz.

Ha az alkalmazás során a készítmény valamilyen mellékhatását tapasztalná, a kezelést hagyja abba, és forduljon kezelőorvosához.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

Megszakítás nélkül 8 hétnél hosszabb ideig nem alkalmazható.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

25 °C alatti hőmérsékleten tartandó.

Csomagolási egység: 50 ml

Nyilvántartási szám: OGYI-264/1991

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

DR. THEISS 

Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10, 66424 Homburg

Magyarországi forgalmazó:

**Natur
Produkt**

Naturprodukt Kft.

2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8