



KÜLSŐLEG ÉS BELSŐLEG ALKALMAZHATÓ GÉL

Betegájékoztató: Információ a felhasználó számára

Original Silicea gél

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információt tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Tulajdonság, hatás: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Mi a készítmény hatóanyaga?

1 ml gél tartalma: 28 mg silica gél, kovásvan anhidriddel (Liquor Natrii silicii)

Mit tartalmaz még a készítmény?

A készítmény segédanyagként tisztított vizet tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A gél külsőleg és belsőleg alkalmazható.

Belsőleg:

- Szilíciumhiány miatt kialakuló
- kötőszöveti gyengeség, gyenge, laza ínzsálak, hajhullás, repedezett

körömök,

- ideges gyomorpanaszok, gyomornyálkahártya irritáció, gyomorégés, puffadás kezelésére.

Külsőleg:

- Enyhe bőrgyulladások, pattanásos bőr, kivörösödött bőr, és
- viszkető rovarcsípés kezelésére.
- Száj- és toroknyálkahártya-gyulladás kiegészítő kezelésére.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

A hatóanyaggal szembeni egyéni érzékenység fennállásakor.

Mit kell tudnia a készítmény alkalmazásának megkezdése előtt?

A szilícium, a szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelem. Elsősorban a kötő- és támasztószövetben fordul elő, szerepe van a fehérjék vízkötő képességének kialakításában és megtartásában. Elengedhetetlenül szükséges az egészséges porc- és csontképzéshez. Vizes oldatai megköti a gyulladásos faktorokat, jó gyulladáscsökkentők, és támogatják a szervezet természetes védekezőképességét. Szilíciumhiányt az állatkísérletek tapasztalatai alapján az okoz, ha az étrend döntően állati eredetű. A szilíciumhiány egyúttal kötő- és támasztószövet (csont, porc) szeretlen anyag hiányával és ezáltal gyengeséggel jár.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

A készítmény alkalmazása nem javasolt gyermekek kezelésére a biztonságosságra és a hatásosságra vonatkozó adatok elégtelensége miatt.

Alkalmazható-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg?

Erre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A készítmény megkötheti az egyidejűleg szedett gyógyszerek hatóanyagait, ezért az Original Silicea és egyéb gyógyszer bevétele között legalább 3 óra teljen el!

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Ezen élethelyzetekben való alkalmazására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az alkalmazás megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészeivel.

Milyen hatással lehet a készítmény a gépjárművezetésre és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre?

A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetői és gépkezelői tevékenységet.

Hogyan kell a készítményt alkalmazni?

A készítmény belsőleg vízzel vagy teával hígítva fogyasztható. Külsőleg hígítás nélkül, vagy vízzel hígítva alkalmazható.





KÜLSŐLEG ÉS BELSŐLEG ALKALMAZHATÓ GÉL

Mi az ajánlott adag és mikor kell a készítményt alkalmazni?

Belsőleg:

- Szilíciumhiány, kötőszöveti gyengeség, íngyengeség, körömrpedezetség kezelésére napi 1 adagolókanál gél vízrel vagy teával hígítva étkezések között részletekben bevenni.

- Ideges gyomorpanaszok, nyálkahártya-irritáció kezelésére naponta 3 x 1 adagolókanál gél vízrel vagy teával hígítva étkezés előtt bevenni.

- Gyomorégés, puffadás kezelésére vízben vagy teában elkeverve 1 adagolókanál készítményt étkezések között részletekben bevenni. Gyomorégésre hajlamos egyéneknek lefekvés előtti bevétele javasolt.

Külsőleg:

- Enyhe bőrgyulladás kezelésére 1:4 arányban vízzel hígítva borogatószerként alkalmazható naponta több (3-4) alkalommal.

- Rovarcsípésre, pattanások kezelésére és kivörösödött bőrfelületre a hígítatlan gél alkalmazható. A kezelés naponta 3-4-szer ismételhető, de előtte a bőrfelületet mindig le kell tisztítani.

- Száj- és toroknyálkahártya-, és fogínygyulladás kezelésére 1:3 arányban langyos vízzel hígítva naponta öblögetni vagy gargarizálni.

Milyen mellékhatást okozhat a készítmény alkalmazása?

A készítmény ez ideig nem okozott mellékhatást. A készítmény tartós – a javasolt adagot túllépve (nagy adagban) – alkalmazása csontképzési zavarokat okozhat.

Ha alkalmazása során mellékhatást tapasztalna, hagyja abba a készítmény szedését!

Ha Önnek bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt mellékhatásokra is vonatkozik.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A készítmény belsőleg kúraszerűen (6 hónap) alkalmazható.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

A készítmény flakonját alkalmazás után gondosan zárja vissza. Felbontás után 4 hétig tartható el hűtőszekrényben. A lejáratá után gyógyászati célra nem használható!

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. Felbontás után hűtőszekrényben (2–8 °C) tartandó. Nem fagyasztható.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: fehéres, opálos, szagtalan, homogén kolloid-oldat, amely íztelen vagy kissé keserű és enyhén összehúzó hatású.

Csomagolás: LDPE záró elemmel ellátott fehér, átlátszatlan, HDPE csavaros kupakkal lezárt fehér, átlátszatlan HDPE flakon, polisztirol adagolókanállal, dobozban.

Csomagolási egység:

200 ml / 500 ml flakonban és dobozban

Nyilvántartási szám:

OGYI-853/2002

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG · Schlossstrasse 11–17
D-79238 Ehrenkirchen, Németország

Magyarországon forgalmazza:

Naturprodukt Kft. · 2046 Törökbálint · DEPO Pf. 8

2017. január 20.

